

Presidente

Gioacchino Tedeschi
Direttore I Clinica Neurologica
e Neurofisiopatologia
Azienda Ospedaliera Universitaria
Università della Campania "Luigi Vanvitelli"
Piazza Miraglia, 2 - 80131 Napoli
Segreteria e Fax 081 5665095
Direzione 081 5665004

Vice Presidente

Massimo Del Sette

Segretario

Alessandro Padovani

Tesoriere

Gabriele Siciliano

Presidente Eletto

Alfredo Berardelli

Past President

Gianluigi Mancardi

Consiglieri

Valeria Caso
Nicola De Stefano
Carlo Ferrarese
Antonio Gambardella
Giuseppe Lauria Pinter
Maurizio Leone
Leonardo Lopiano
Alessandra Lugaresi
Eduardo Nobile-Orazio
Rocco Quatralo
Francesco Rosario Rodolico
Simona Sacco
Serenella Servidei
Carla Tortorella

Probiviri

Elio Clemente Agostoni
Isabella Laura Simone
Mario Zappia

Segreteria Organizzativa

SienaCongress
Via del Rastrello, 7 - 53100 Siena
Tel. 0577 286003
Fax 0577 282731
Email info@neuro.it

Sito SIN

www.neuro.it

Indicazioni sulla gestione del paziente con SM nel corso di epidemia da COVID-19

Si tratta di consigli e indicazioni formulate da specialisti neurologi e infettivologi in assenza di dati clinici evidence-based

Trattamento paziente con SM:

Data la mancanza di dati sul decorso della malattia da COVID-19 in pazienti con SM in terapia, non ci sono al momento indicazioni ad interrompere i diversi farmaci impiegati nella SM ed esporre il paziente al rischio di riattivazione di malattia.

Pertanto è consigliato continuare il trattamento con la terapia in corso in particolare con:

- i trattamenti di prima linea (interferoni (Avonex, Betaferon, Extavia, Rebif 22, Rebif 44, Plegridy), glatiramer acetato (Copaxone 20, Copaxone 40), glatiramoidi (Copemeyl, Copemyiltri) teriflunomide (Aubagio), dimetilfumarato (Tecfidera 120 e 240). Questi farmaci possono essere dispensati al Centro come di consueto

- fingolimod/Gilenya

- natalizumab/Tysabri

- **per le terapie depletive (linfocitopenizzanti):** da considerare, caso per caso

- **il posticipo temporaneo dell'inizio di terapie depletive** con ocrelizumab (Ocrevus), alemtuzumab (Lemtrada), rituximab (Rixathon, Truxima, Mabthera, etc) e cladribina (Mavenclad).
- **Il posticipo di ri-trattamenti** con alemtuzumab (Lemtrada), ocrelizumab (Ocrevus) e cladribina (Mavenclad). Ossia va considerata la posticipazione semestrale o annuali a seconda del farmaco, sempre se clinicamente fattibile. In particolare per i farmaci anti CD-20 si suggerisce di ritardare l'infusione anche oltre i 6 mesi, qualora i linfociti CD19 e CD 20 risultassero azzerati al tempo previsto di reinfusione.
- **Casi particolari** da tenere in considerazione: se il paziente ha iniziato trattamento con primo ciclo fatto di due somministrazioni di ocrelizumab e cladribina, essendo oramai immunosoppresso il ciclo andrebbe completato consigliando maggiori precauzioni.

In caso di infezione confermata da COVID-19, sospendere qualsiasi terapia di I e II linea fino a soluzione del quadro clinico o rivalutazione specialistica infettivologica (a discrezione del curante la prosecuzione di interferone per i dati di possibile azione antivirale presenti in letteratura).

Presidente

Gioacchino Tedeschi
Direttore I Clinica Neurologica
e Neurofisiopatologia
Azienda Ospedaliera Universitaria
Università della Campania "Luigi Vanvitelli"
Piazza Miraglia, 2 - 80131 Napoli
Segreteria e Fax 081 5665095
Direzione 081 5665004

Vice Presidente

Massimo Del Sette

Segretario

Alessandro Padovani

Tesoriere

Gabriele Siciliano

Presidente Eletto

Alfredo Berardelli

Past President

Gianluigi Mancardi

Consiglieri

Valeria Caso
Nicola De Stefano
Carlo Ferrarese
Antonio Gambardella
Giuseppe Lauria Pinter
Maurizio Leone
Leonardo Lopiano
Alessandra Lugaresi
Eduardo Nobile-Orazio
Rocco Quatralo
Francesco Rosario Rodolico
Simona Sacco
Serenella Servidei
Carla Tortorella

Probiviri

Elio Clemente Agostoni
Isabella Laura Simone
Mario Zappia

Segreteria Organizzativa

SienaCongress
Via del Rastrello, 7 - 53100 Siena
Tel. 0577 286003
Fax 0577 282731
Email info@neuro.it

Sito SIN

www.neuro.it

Sintomi di sospetto di infezione da COVID-19: febbre, tosse secca e astenia

Cosa fare in caso di comparsa dei sintomi?

comunicare al paziente di non recarsi nei Pronto Soccorso per non affollarli e non rischiare di contagiare o essere contagiati: bisogna chiamare i numeri di emergenza, segnalare le proprie condizioni di salute e attendere le indicazioni degli operatori

decidere la sospensione del trattamento in corso.

Consigli da fornire al paziente e agli operatori ai centri SM utili per evitare il rischio di contrarre l'infezione da Coronavirus (COVID-19):

Ove possibile evitare di recarsi in luoghi di aggregazione sociale: cinema, teatri, scuole, ecc.

- Imitare l'accesso al Centro al solo paziente (almeno nelle aree nazionali maggiormente interessate dalla epidemia)

- fare indossare la mascherina in uso ai Chirurghi per quei pazienti che praticano terapie infusionali immunosoppressive

- nel caso si renda necessario viaggiare o spostarsi con mezzi pubblici, si consiglia l'uso precauzionale di una mascherina e un adeguato lavaggio delle mani, in particolare per i pazienti che assumono Gylenia, Lemtrada, Ocrevus, Mavenclad, Rituximab)

Prediligere il lavoro da casa se possibile

Porre maggiore attenzione all'igiene personale, in particolare lavarsi frequentemente le mani;

Tali indicazioni sono indicazioni di massima, vanno considerate alla luce delle varie disposizioni regionali e sono suscettibili di modificazioni nel tempo in base all'evoluzione dell'infezione da COVID-19 in atto.